

Patientenkarte für Topiramat

Für Frauen und Mädchen, die schwanger werden können – Empfängnis- und Schwangerschaftsverhütung

Was Sie wissen müssen

- Dieses Arzneimittel enthält Topiramat und wird zur Behandlung von Epilepsie und zur Vorbeugung von Migränekopfschmerzen eingesetzt.
- Topiramat kann ein ungeborenes Kind ernsthaft schädigen, wenn es während der Schwangerschaft eingenommen wird.

Was Sie tun müssen

- Lesen Sie die Packungsbeilage und den Patientenleitfaden vor der Einnahme sorgfältig durch.
- Sie müssen während der Behandlung mit Topiramat und mindestens 4 Wochen nach der letzten Topiramat-Dosis hochwirksame Verhütungsmittel anwenden. Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin wird Sie über die für Sie am besten geeignete Verhütungsmethode beraten.
- Suchen Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin mindestens einmal im Jahr auf, um Ihre Behandlung zu überprüfen.
- Wenn Sie glauben, schwanger zu sein, sprechen Sie sofort mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin.
- Wenn Sie darüber nachdenken, ein Kind zu bekommen, setzen Sie die Empfängnisverhütung nicht ab, bevor Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin gesprochen haben.
- Wenn Sie Epilepsie haben, setzen Sie Topiramat nur auf Anweisung Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin ab, da sich Ihr Zustand sonst verschlechtern kann.

Fragen Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin nach dem Patientenleitfaden.

Bewahren Sie diese Karte auf.