



Freienbach, novembre 2025

Message important pour éviter les erreurs de manipulation

DIBASE® 10'000 U.I., cholécalciférol (65856) Solution buvable en gouttes

Remarques concernant l'administration correcte de DIBASE® 10'000 U.I., gouttes buvables

Mesdames, Messieurs

En accord avec Swissmedic, EffRx Pharmaceuticals SA vous informe des faits suivants.

Nous avons reçu quelques retours indiquant que le compte-gouttes (la pipette) destiné à l'administration de DIBASE® 10'000 U.I. avait été introduit directement dans la bouche.

Utilisation correcte de DIBASE® 10'000 U.I.

Introduire le bouchon pipette dans le flacon pour prélever le contenu. <u>Ne pas</u> visser la pipette sur le flacon.

DIBASE[®] 10'000 U.I. <u>ne</u> doit <u>pas</u> être administré directement dans la bouche avec la pipette. Le nombre de gouttes prescrit doit être déposé à l'aide de la pipette sur une cuillère, puis administré.





Prendre avec une cuillère.

Après l'utilisation, refermer le flacon avec le couvercle et remettre le bouchon pipette dans le cylindre en plastique et le visser.

La prise de DIBASE® à partir de la pipette directement dans la bouche <u>n'est pas</u> conforme aux instructions d'utilisation recommandées dans les informations professionnelles et destinées aux patients approuvées.

Déclaration d'effets indésirables

Pour le signalement de tout effet indésirable (EI), Swissmedic recommande aux personnes concernées d'utiliser l'Electronic Vigilance System (EIViS), l'outil de déclaration d'effets indésirables. Toutes les informations nécessaires sont disponibles sous www.swissmedic.ch.

Coordonnées

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter medicalinfo@effrx.com.

Nous vous remercions de votre attention et de votre vigilance et vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés.

Département médical EffRx Pharmaceuticals SA